



ANAIS DO  
**SIMPÓSIO  
DE TCC**

**FUNORTE/ICS**

ISSN 2596-1365

 **Centro de  
Pesquisa**

 **FUNORTE**  
CENTRO UNIVERSITÁRIO

## Centro Universitário do Norte de Minas

# XXI Anais do Simpósio de TCC – FUNORTE/ICS

ICS, Montes Claros, v. 11, n. 21, jan./jun. 2024

14 de junho

### Editores

Árlen Almeida Duarte de Sousa

Janini Tatiane Lima Souza Maia

Mariângela Martins Batista

### Comissão Organizadora do Evento

Árlen Almeida Duarte de Sousa

Henrique Andrade Barbosa

Janini Tatiane Lima Souza Maia

Laura Adriana Ribeiro Lopes

Mariângela Martins Batista

Vilmária Cavalcante Araújo Mota

### Comissão Organizadora dos Anais

Árlen Almeida Duarte de Sousa

Henrique Andrade Barbosa

Janini Tatiane Lima Souza Maia

Laura Adriana Ribeiro Lopes

Mariângela Martins Batista

Vilmária Cavalcante Araújo Mota

Centro Universitário do Norte de Minas (UNINORTE).  
Centro de Pesquisa – CP.  
Av. Osmane Barbosa, n. 11.111, Bairro JK, Montes Claros-MG. CEP: 39404-006.  
Telefone: (38) 2101-9288.

XXI Anais do Simpósio de TCC – FUNORTE/ICS  
Editado em julho de 2024.  
Publicado em agosto de 2024.  
ISSN: 2596-1365.



[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## Corpo Dirigente da Instituição

### **Diretora Geral**

Sueli dos Reis Nobre Ferreira

### **Diretora Acadêmica**

Thalita Pimentel Nunes

### **Diretora Administrativo-Financeira**

Sabrina Gonçalves Silva

### **Coordenador do Centro de Pesquisa-Plataforma I**

Árlen Almeida Duarte de Sousa

### **Coordenador do Centro de Pesquisa FASI**

Henrique Andrade Barbosa

## Centro de Pesquisa

### **Revisão metodológica**

Árlen Almeida Duarte de Sousa

Mariângela Martins Batista

### **Revisão ortográfica e gramatical**

Nely Raquel Veloso Lauto

### **Projeto gráfico e capa**

Roberth Rodrigues dos Santos

### **Preparação**

Árlen Almeida Duarte de Sousa

Nota: para ter acesso ao texto completo, procure o Centro de Pesquisa de sua Unidade. O arquivo digital do trabalho de conclusão de curso será fornecido via e-mail.

## SUMÁRIO

<b>ENFERMAGEM</b> .....	5
A PERCEPÇÃO DO USUÁRIO SOBRE AS ATRIBUIÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA .	5
IMPACTO DO DIAGNÓSTICO INICIAL NA OCORRÊNCIA DE COMPLICAÇÕES PÓS- TRANSPLANTE HEPÁTICO .....	6
PERCEPÇÃO SOBRE A VACINAÇÃO EM CRIANÇAS DE ATÉ OS QUATRO ANOS DE IDADE.....	7
RAZÕES PARA O ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO ATÉ OS SEIS MESES DE VIDA.....	8
<b>FISIOTERAPIA</b> .....	9
EFICÁCIA DA CINESIOTERAPIA NO PÓS-ACIDENTE VASCULAR CEEERAL - AVC.....	9
LESÕES EM ATLETAS DE VÔLEI.....	10
PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL ENTRE UNIVERSITÁRIOS .....	11
QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES COM CÂNCER DE MAMA SUBMETIDAS A TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO .....	12
QUALIDADE DO SONO E FATORES ASSOCIADOS EM ADULTOS COM E SEM DOR CRÔNICA ..	13
TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DA BURSITE SUBACROMIAL.....	14
<b>MEDICINA</b> .....	15
ABORDAGEM DA AUTOMUTILAÇÃO EM PACIENTES PORTADORES DA SÍNDROME DE LESCH- NYHAN: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA .....	15
ABORDAGEM TERAPÊUTICA DA SÍNDROME DE PRUNE BELLY: RELATO DE CASO .....	16
ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA: IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA E EXPERIÊNCIA DE TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA ORAL – RELATO DE CASO .....	17
ADENOCARCINOMA DE APÊNDICE: RELATO DE CASO .....	18
AGENESIA DE VESÍCULA BILIAR: RELATO DE CASO.....	19
CISTO DO COLÉDOCO: RELATO DE CASO.....	20
CONHECIMENTO EM CUIDADOS PALIATIVOS ENTRE ESTUDANTES DE MEDICINA .....	21
DESAFIOS NO DIAGNÓSTICO E MANEJO CLÍNICO DA FEBRE DE ORIGEM INDETERMINADA: RELATO DE CASO.....	22
DIAGNÓSTICO DA SÍNDROME DE MAY THURNER: RELATO DE CASO.....	23
DIAGNÓSTICO E MANEJO CLÍNICO DA SARCOPENIA EM PACIENTES CIRRÓTICOS: REVISÃO SISTEMÁTICA INTEGRATIVA DA LITERATURA .....	24
DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE TERATOMA MEDIASTINAL: UM RELATO DE CASO.....	25
EIXO ENCÉFALO-INTESTINO: RELAÇÃO ENTRE A MICROBIOTA INTESTINAL E SINTOMAS DEPRESSIVOS.....	26
GRAVIDEZ HETEROTÓPICA, UMA EMERGÊNCIA CIRÚRGICA: RELATO DE CASO .....	27
IMPLICAÇÕES DE UMA MATERNIDADE ATÍPICA: ESTADO PSICOSSOCIAL DAS MÃES DE CRIANÇAS AUTISTAS.....	28
IMPORTÂNCIA DA DERMATOSCOPIA DIGITAL NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PORTADOR DA SÍNDROME DO NEVO DISPLÁSICO: RELATO DE CASO .....	29

LEISHMANIOSE MUCOCUTÂNEA FACIAL: RELATO DE CASO .....	30
MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL NA DOENÇA DE KIKUCHI-FUJIMOTO: RELATO DE CASO .....	31
OLIGOIDRÂMPIO SEVERO: RELATO DE CASO .....	32
PNEUMOTÓRAX ESPONTÂNEO PRIMÁRIO: RELATO DE CASO.....	33
SÍNDROME DE QUEBRA NOZES: UM RELATO DE CASO .....	34
SÍNDROME DE SENIOR-LOKEN: RELATO DE CASO.....	35
TÉCNICA DE FIGUEIREDO EM MORDEDURA DE ANIMAL: RELATO DE CASO.....	36
TRANSPLANTE DE ALOENXERTO EM RE-RUPTURA DE TENDÃO QUADRICIPITAL: UM RELATO DE CASO .....	37
VÁLVULA DE URETRA POSTERIOR: UM RELATO DE CASO .....	38
ANGIOEDEMA HEREDITÁRIO, UMA EMERGÊNCIA MÉDICA: RELATO DE CASO .....	39
ASSOCIAÇÃO ENTRE MAUS TRATOS NA INFÂNCIA E DESENVOLVIMENTO DE DOENÇAS PSIQUIÁTRICAS: REVISÃO SISTEMÁTICA.....	40
DISTROFIA MIOTÔNICA TIPO 1 DE STEINERT: RELATO DE CASO .....	41
SÍNDROME DE LESCH NYHAN: RELATO DE CASO.....	42
O IMPACTO DA SÍNDROME DE BURNOUT NA CLASSE MÉDICA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 .....	43
FATORES DE RISCO ASSOCIADOS AO DESENVOLVIMENTO DOS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA .....	44
FATORES DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRANSTORNOS DE HUMOR EM PACIENTES PORTADORES DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA .....	45
TRATAMENTO CLÍNICO E CIRÚRGICO DA RETOCOLITE ULCERATIVA: RELATO DE CASO ....	46

## ENFERMAGEM

### A PERCEPÇÃO DO USUÁRIO SOBRE AS ATRIBUIÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Daniel Moreira Damasceno  
Tamires Ferreira Guimarães  
Sélen Jaqueline Souza Ruas

**Objetivo:** avaliar o nível de satisfação dos usuários acerca dos serviços ofertados em uma ESF do município de Montes Claros, no Estado de Minas Gerais. **Materiais e Métodos:** trata-se de uma pesquisa quantitativa e descritiva, com amostragem por conveniência de homens e mulheres maiores de 18 anos que sejam usuários da ESF por mais de um ano. A coleta de dados foi realizada usando-se um questionário estruturado com 25 perguntas objetivas. **Resultados:** Observou-se que os usuários procuravam mais de um atendimento no dia da entrevista, sendo o atendimento médico a maior procura (80,48%). Dos entrevistados, 61,8% mostraram-se satisfeitos com o tempo de espera; 84,6 satisfeitos com os serviços ofertados na unidade; em relação ao atendimento recebido pelos profissionais, 85,3% mostraram-se satisfeitos; sobre a qualidade dos serviços e horário de funcionamento, 78,5% estavam satisfeitos no dia da pesquisa. Por fim, 82,1% dos entrevistados mostraram-se satisfeitos com a comunicação e clareza com que as informações são passadas. **Conclusão:** registrou-se a pertinência do instrumento quantitativo formulado como um recurso adequado à realidade local. Assim, analisaram-se as informações acerca das percepções dos usuários investigados quanto às atribuições da ESF.

**Palavras-chave:** Estratégia saúde da família. Avaliação dos serviços de saúde. Satisfação do usuário.

## IMPACTO DO DIAGNÓSTICO INICIAL NA OCORRÊNCIA DE COMPLICAÇÕES PÓS-TRANSPLANTE HEPÁTICO

Maria Eduarda Braga e Quadros  
Vinicius Mendonça Bonfati  
Sélen Jaqueline Souza Ruas

**Objetivo:** descrever a prevalência de reinternação de pacientes submetidos à transplantes de fígado e às suas complicações por grupos diagnósticos. **Materiais e Métodos:** o estudo foi realizado em um centro especializado em transplante de fígado no norte de Minas Gerais. Incluiu pacientes transplantados, com idade variada e diversos diagnósticos. A análise usou dados retrospectivos de registros médicos e planilhas no Excel, excluindo óbitos e transplantes após janeiro de 2024. **Resultados:** foram 166 reinternações em pacientes submetidos à transplante hepático, com uma taxa de reinternação de 66,3%. No total foram registradas 460 reinternações. 204 apresentaram diagnósticos com prevalência de reinternação de 66,2%. Pacientes com cirrose hepática etanólica apresentaram 39,3% do histórico de reinternação, enquanto pacientes com doença hepática criptogênica tiveram prevalência de 20%, estando à frente do hepatocarcinoma, mostrando taxa de reinternações em 11,9%. As complicações pós-transplante foram categorizadas em 17 grupos, com prevalência do sistema urinário 21,7%, biliar 14,6% e imunológico 11,3%. **Conclusão:** o estudo revelou alta taxa de reinternação entre pacientes transplantados, destacando-se a necessidade de intervenções eficazes e estratégias personalizadas no manejo pós-transplante. A distribuição desigual dos pacientes por grupos de diagnóstico limitou a robustez das análises, mas evidenciou a importância do monitoramento e tratamento direcionados.

**Palavras-chave:** Transplante de Fígado. Complicações Pós-Operatórias. Internação Hospitalar.

## PERCEPÇÃO SOBRE A VACINAÇÃO EM CRIANÇAS DE ATÉ OS QUATRO ANOS DE IDADE

Vitoria Miranda Bonfati  
Gabriel Matos Martins  
Agna Soares da Silva Menezes

**Objetivo:** conhecer a percepção dos pais ou responsáveis sobre a importância da vacinação de crianças de até 4 anos de idade. **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo descritivo, transversal com caráter quantitativo. Fizeram parte da população do estudo pais ou responsáveis pelas crianças de até 4 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias). O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um formulário do Google elaborado com perguntas simples e estratégicas. O primeiro passo foi o contato direto com o enfermeiro da equipe sorteada enviou os formulários via whatsapp para os pais ou responsáveis dessas crianças. A participação no estudo foi consentida através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). **Resultados:** participaram do estudo 87 pais ou responsáveis pelas crianças de até 4 anos de idade. No perfil sociodemográfico, destaca-se que 86,2% dos participantes eram do sexo feminino, na faixa etária entre 21 e 40 anos. Quando questionados sobre os benefícios da vacinação, nota-se que 50,6% dos participantes acreditam na vacinação como proteção de doenças e 42,5% acreditam que esse ato reduz o contágio através de doenças infecciosas. **Conclusão:** muitos pais e/ou responsáveis não conseguem dar todo o suporte necessário à saúde dos filhos. Uma estratégia que poderia ser útil certamente centra-se na parceria entre família e escola que, por sua vez, tece uma relação com as unidades de saúde a fim de promover, no próprio ambiente escolar, de imunização e educação das próprias crianças acerca dos benefícios da ciência.

**Palavras-chave:** Vacinação. Percepção. Crianças.



## **RAZÕES PARA O ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO ATÉ OS SEIS MESES DE VIDA**

Débora Silva Paraiso  
Aгна Soares da Silva Menezes

**Objetivo:** descrever a importância do aleitamento materno para o desenvolvimento e saúde dos bebês e os benefícios desse procedimento na percepção das mães. **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo transversal e descritivo, com abordagem quantitativa. A população do estudo foi composta por 21 participantes, sendo mães com bebês de até seis meses de vida. A coleta de dados foi realizada a partir de um questionário com variáveis a respeito do tema. Para a análise dos dados, foi utilizado o software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS®) versão 21.0 for Windows®. **Resultados:** observou-se predominância de faixa etária de 26 a 31 anos (57,14%), ensino médio (42,86%), casada (71,43%), com trabalho (61,90%). Constatou-se que 85,71% das mães tiveram informações sobre o aleitamento materno durante a gravidez. Em relação às razões que podem levar à interrupção da amamentação, todas as participantes relataram que o fato de não possuir leite suficiente ou o leite ser fraco e não alimentar bem seu bebê seriam motivos de interrupção. No que tange às dificuldades durante a amamentação, o fator que mais se destacou foi o ingurgimento mamário (14,29%). **Conclusão:** os resultados reforçam a necessidade de orientações sobre a amamentação durante a gestação e de outros estudos relacionados ao aleitamento materno, visando promover uma experiência de amamentação positiva e bem-sucedida, beneficiando tanto a saúde da criança quanto a da mãe.

**Palavras-chave:** Aleitamento Materno Exclusivo. Benefícios do leite Materno. Desmame precoce.

## FISIOTERAPIA

### EFICÁCIA DA CINESIOTERAPIA NO PÓS-ACIDENTE VASCULAR CEREAL - AVC

Ana Paula Freitas Pereira  
Renata Luiza Ferreira  
Maximino Alencar Bezerra Junior

**Objetivo:** analisar os efeitos da cinesioterapia na reabilitação de pacientes Pós-Acidente Vascular Cerebral (AVC). **Materiais e Métodos:** o presente estudo descritivo, quantitativo e de corte transversal com análise dos efeitos da cinesioterapia na reabilitação de pacientes pós-AVC. Como instrumento de pesquisa, foi realizada a coleta de dados por meio de prontuários de pacientes tratados em uma clínica-escola, abrangendo desde a anamnese até as condutas fisioterapêuticas e evoluções dos pacientes após o Acidente Vascular Cerebral. **Resultados:** os resultados indicaram que a maioria dos participantes procurou tratamento imediatamente após o AVC e a cinesioterapia demonstrou ser eficaz em diferentes estágios de recuperação após o ocorrido. Houve uma variedade de alterações neurológicas e funcionais observadas nos pacientes, destacando-se a diversidade das necessidades desse grupo. **Conclusão:** foi possível observar que a cinesioterapia representa um tratamento eficaz na reabilitação de pacientes pós-AVC, destacando sua eficácia em diferentes estágios de recuperação. Recomenda-se uma abordagem integrada e personalizada, combinando cinesioterapia com outras terapias para promover a independência dos pacientes. Este estudo fornece observações valiosas para a prática clínica e destaca a importância contínua da pesquisa na área de reabilitação neurológica Pós- Acidente Vascular Cerebral.

**Palavras-chave:** Fisioterapia. Cinesioterapia. Acidente vascular cerebral.

## LESÕES EM ATLETAS DE VÔLEI

Ana Carina da Silva Soares  
Igor Medeiros dos Santos  
Jomar Luiz Santos de Almeida  
Wellington Danilo Soares

**Objetivo:** analisar a prevalência das lesões em atletas profissionais de vôlei na cidade de Montes Claros-MG. **Materiais e Métodos:** estudo descritivo quantitativo, retrospectivo e transversal. A amostra foi constituída de 12 prontuários de atletas, todos profissionais do time Montes Claros América Volei, avaliados em uma clínica de fisioterapia na cidade de Montes Claros- MG. Como instrumento, foram utilizados prontuários, com dados pessoais (nome e idade) dados clínicos (diagnóstico, tratamentos, prognóstico) e dados referentes à posição nos jogos (levantador, oposto, ponteiro, central e líbero). **Resultados:** foram analisados os prontuários de 12 jogadores, com idades entre 22 e 38 anos. A análise demonstrou que a tendinopatia do supraespinhoso foi o diagnóstico mais comum, com 20 casos de lesões, seguida pela condropatia patelar e pelo estiramento semimembranoso grau II, cada um com 17 casos. O estudo revelou que a tendinopatia do supraespinhoso foi a condição mais prevalente, com 20 casos de lesões registrados. Em seguida, apareceram a condropatia patelar e o estiramento semimembranoso grau II, ambos com 17 casos. A análise demonstrou que a tendinopatia do supraespinhoso foi o diagnóstico mais comum, com 20 casos de lesões, seguida pela condropatia patelar e pelo estiramento semimembranoso grau II, cada um com 17 casos. **Conclusão:** por fim, foi possível concluir que as lesões de maior prevalência foram a tendinopatia do supraespinhoso e a condropatia patelar. Não foram encontradas correlações entre as variáveis pesquisadas.

**Palavras-chave:** Atletas. Fisioterapia. Prevalência. Voleibol.

## PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL ENTRE UNIVERSITÁRIOS

Bruno Soares dos Santos  
Renata Ribeiro Durães

**Objetivo:** verificar a prevalência de hipertensão arterial entre universitários jovens. **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo de caráter descritivo, prospectivo, corte transversal e análise quantitativa. A população foi composta por 35 universitários com idade entre 22 e 30 anos, cuja graduação em curso ocorre no Campus Amazonas em Montes Claros - Brasil. O instrumento utilizado foi um questionário on-line, construído pelos próprios pesquisadores, e outro para avaliar o nível de atividade física, o questionário internacional de atividade física – IPAQ em sua versão curta, aplicado por meio do Google Forms. A análise estatística foi realizada, utilizando-se o software Statistical Package for the Social Science versão 21. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Associação Educativa do Brasil, conforme o Parecer n. 6.633.827. **Resultados:** observou-se que, entre os avaliados, 72,7% realizaram aferição da pressão arterial nos últimos 30 dias. Destes, 6,1% apresentaram diagnóstico de pressão arterial elevada. **Conclusão:** a amostra estudada apresentou baixa prevalência de HAS, fato que pode ter sido pelo número pequeno de participantes, porém foi identificado um número expressivo de participantes que apresentam sintomas de depressão e uso de medicação para tratamento dessa doença.

**Palavras-chave:** Hipertensão. Jovens. Universitários.

## QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES COM CÂNCER DE MAMA SUBMETIDAS A TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO

Amanda Lôpo Santana  
Vanessa Ferreira Alves  
Renata Ribeiro Durães

**Objetivo:** verificar a qualidade de vida de mulheres com câncer (CA) de mama submetidas a tratamento fisioterapêutico. **Materiais e Métodos:** estudo descritivo, transversal e análise quantitativa, cuja amostra foi composta por 33 pacientes mulheres que tiveram diagnóstico de CA de mama e passaram por tratamento fisioterapêutico em Montes Claros-MG, Brasil. A coleta de dados foi de forma on-line, por meio do *google forms*. Como instrumentos, foram utilizados o questionário sociodemográfico, o *European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC)*, *Quality of Life Questionnaire (QLQ)* e o específico *Breast Cancer Module (BR-23)*, que avalia a qualidade de vida em pacientes com câncer de mama. Para a análise dos dados, foi utilizado o *Software Statistical Package for the Social Sciences® (SPSS) 23*. **Resultados:** das participantes, 36,4% realizaram lumpectomia, 54,4% tiveram um tempo de tratamento superior a 4 meses e 36,4% relataram melhora moderada do quadro. **Conclusão:** observou-se que não houve comprometimento importante das AVD's e AVDI's, e em relação à qualidade de vida, de modo que esta não foi tão comprometida. Já a percepção das mulheres com relação ao tratamento fisioterapêutico evidenciou que houve grande melhora com a terapêutica.

**Palavras-chave:** Neoplasia de mama. Fisioterapia. Qualidade de vida.

## QUALIDADE DO SONO E FATORES ASSOCIADOS EM ADULTOS COM E SEM DOR CRÔNICA

Lara Fonseca Dias  
Tulio José Nunes Souza  
Christiane Athayde Santos

**Objetivo:** avaliar a qualidade do sono em adultos brasileiros, com e sem dor crônica, e investigar fatores associados à pior qualidade do sono. **Materiais e Métodos:** trata-se de estudo observacional, transversal e analítico. A amostra constituiu-se de indivíduos brasileiros adultos. A coleta de dados ocorreu entre 12 de março e 02 de maio de 2024 por meio de formulário *online* da plataforma *Google Forms*. Foram investigados dados sociodemográficos e laborais, hábitos de vida, condições de saúde e dados sobre dor. A qualidade do sono foi mensurada pelo Índice de Qualidade do Sono de *Pittsburgh* (PSQI). Os dados foram analisados por meio do *software Statistical Package for the Social Sciences* versão 25. Foi utilizado o teste do Qui-quadrado com nível de significância de 5%. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/SOEBRAS com o Parecer de nº 6.633.832. **Resultados:** foram incluídos no estudo 315 formulários de indivíduos adultos com média de idade de  $28,26 \pm 8,54$ . Os escores do PSQI evidenciaram que 68,3% apresentaram qualidade ruim do sono e a prevalência de dor crônica foi de 37,1%. Houve associação estatisticamente significativa entre a má qualidade do sono e dor crônica ( $p = 0,00$ ), estado civil ( $p = 0,007$ ), nível de escolaridade ( $p = 0,05$ ), controle rígido de produtividade ( $p = 0,03$ ) e jornada de trabalho prolongada ( $p = 0,01$ ). **Conclusão:** a elevada prevalência de qualidade ruim do sono e sua associação com dor crônica e variáveis laborais merecem maior atenção em prol da saúde de indivíduos afetados.

**Palavras-chave:** Qualidade do Sono. Dor crônica. Distúrbios do sono. Prevalência. Ergonomia.

## TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DA BURSITE SUBACROMIAL

Jhonnata Phelipe Neves de Jesus  
Valeska Jhennifer Alves Andrade  
Wellington Danilo Soares

**Objetivo:** comparar a utilização e a eficácia da eletroterapia e a terapia manual no tratamento da bursite subacromial em Montes Claros, MG. **Materiais e métodos:** a amostra foi composta por 41 indivíduos de ambos os sexos, com idade de 28 a 84 anos ( $54,7 \pm 14,8$  anos), com predomínio do sexo feminino com (82,9%). Esses participantes foram divididos em dois grupos, um grupo recebeu tratamento predominantemente com eletroterapia e o outro grupo, com terapia manual. Todos os participantes tinham diagnóstico de bursite subacromial. A coleta de dados foi realizada em dois modos, por meio da aplicação de um questionário *online* que incluiu o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e utilizou-se a técnica de snowball sampling, na qual participantes com diagnóstico de bursite foram entrevistados e indicaram outros participantes aptos a responderem ao questionário. Os dados foram planilhados e tabulados pelo *Statistical Package for Social Science* (SPSS) versão 29.0 para *Windows*. **Resultados:** constatou-se que a maioria dos participantes realizava trabalhos braçais e relatava sensação leve de dor. No entanto, um número considerável (53,1%) informou sentir dor moderada ou intensa. Em relação ao tratamento da bursite subacromial, a maior parte dos participantes utilizou 10 ou 20 sessões. **Conclusão:** o estudo comparou terapia manual e eletroterapia no tratamento da bursite subacromial, mostrando que ambas são eficazes na redução da dor e melhora da mobilidade, sem diferenças significativas. A maioria dos pacientes realizava trabalhos braçais repetitivos, com destaque para a participação feminina devido à dupla carga de trabalho. A melhora foi observada em 10 a 20 sessões, sugerindo a necessidade de mais estudos para determinar a quantidade ideal de sessões.

**Palavras-chave:** Eletroterapia. Bursite Subacromial. Terapia Manual. Tratamento.

## MEDICINA

### **ABORDAGEM DA AUTOMUTILAÇÃO EM PACIENTES PORTADORES DA SÍNDROME DE LESCH-NYHAN: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA**

Larissa Marzagão Ferreira  
Maria Cecília Machado Ribeiro Rodrigues  
Pedro Eleutério dos Santos Neto

**Objetivo:** identificar as possibilidades de manejo da automutilação nos pacientes com Síndrome de Lesch-Nyahn, definindo as abordagens preferíveis e de melhor desfecho ao paciente. **Materiais e Métodos:** revisão sistemática integrativa de literatura, realizada através de consultas ao banco de dados da CAPES e da PubMed, utilizando os seguintes descritores: *lesch-nyhan*, *self-mutilation*, *treatment* e *lesch-nyhan*, *self-injury*, *treatment*. **Resultados:** foram encontrados 153 resultados, 23 no Pubmed e 130 no CAPES. Após a aplicação dos critérios metodológicos, foram excluídos 117 artigos e selecionados 36, os quais foram incluídos em uma tabela para melhor comparação. **Conclusão:** a revisão supracitada permitiu detectar os métodos mais eficientes em relação ao CAD, ou seja, os protetores bucais, como terapia não invasiva, e a estimulação do globo pálido a partir de eletrodos, como método invasivo. Considerando a raridade da síndrome, pressupõe-se que o conhecimento acerca da condução desses casos não é amplamente disseminado. Dessa forma, ao reunir as possibilidades de tratamento mais relevantes, espera-se auxiliar o profissional no manejo do quadro, para que ele possa propiciar melhor cuidado ao paciente.

**Palavras-chave:** Doença da Deficiência de Hipoxantina-Fosforribosiltransferase Síndrome de Hiperuricemia. Ácido Úrico. Comportamento Autodestrutivo.



## **ABORDAGEM TERAPÊUTICA DA SÍNDROME DE PRUNE BELLY: RELATO DE CASO**

Bruna Rodrigues Alkmim  
Thayná Campos Duarte  
Pedro Eleutério dos Santos Neto

**Objetivo:** descrever um caso de síndrome de Prune Belly (SPB) com suspeita diagnóstica intrauterina e confirmação clínica pós-parto, com ênfase na abordagem terapêutica. **Materiais e Métodos:** trata-se de estudo descritivo do tipo relato de caso de paciente, sexo masculino, 14 anos, com suspeita diagnóstica pré-natal e confirmação pós-natal de SPB. **Relato de Caso:** paciente com hipótese diagnóstica intrauterina de SPB, nascido de parto cesário com 37 semanas. Ao nascimento, observaram-se abdome com aspecto de “ameixa seca”, criptorquidia bilateral e alterações no trato urinário, corroborando para o diagnóstico. Ao longo de 14 anos, realizaram-se diversas intervenções cirúrgicas, como cistoenteroplastia, orquidopexia à direita, dermolipectomia abdominal e confecção de cateterismo intermitente através da dilatação de *Mitrofanoff*, por recidiva de retenção urinária. Na puberdade, submeteu-se a herniorrafia incisional paraumbilical à direita, resultante de abdominoplastia prévia. Após esse período, apresenta-se estável e segue em acompanhamento médico e vigilância da função renal. **Conclusão:** o diagnóstico precoce e a abordagem terapêutica individualizada na SPB promovem qualidade de vida e preservação da função renal.

**Palavras-chave:** Terapêutica. Diagnóstico intrauterino. Síndrome do abdome em ameixa seca. Insuficiência renal. Prognóstico.

## **ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA: IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA E EXPERIÊNCIA DE TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA ORAL – RELATO DE CASO**

Beatriz Caires Matos  
Claudiojanes dos Reis  
Luana Christine Oliveira  
Paula Quadros

**Objetivo:** escrever a história clínica, desde o diagnóstico até a finalização do tratamento, de uma paciente com alergia à proteína do leite de vaca. **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo do tipo relato de um caso de criança de 11 anos em imunoterapia oral para tratamento da alergia à proteína do leite de vaca. Foram analisados o prontuário médico e as informações dadas pela paciente e pela médica assistente. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Associação Educativa do Brasil. **Resultados:** após 6 meses em imunoterapia, a paciente adquiriu tolerância oral ao leite de vaca com melhora significativa em sua qualidade de vida, devendo manter ingestão mínima diária de 200ml durante pelo menos 3 anos. **Conclusão:** a análise revelou que o desenvolvimento da tolerância oral à proteína do leite através da imunoterapia apresenta melhora significativa da qualidade de vida dos portadores dessa condição clínica.

**Palavras-chave:** Alergia alimentar. Mecanismo de defesa. Inflamação. Proteína do leite. Leite de vaca.

## ADENOCARCINOMA DE APÊNDICE: RELATO DE CASO

Bianca Mansine  
Larissa Lélis Teixeira Reis  
Pedro Eleutério dos Santos Neto

**Objetivo:** descrever o caso de paciente com adenocarcinoma mucinoso de apêndice, com diagnóstico inicial de apendicite aguda grau IV. **Materiais e Métodos:** trata-se de estudo descritivo do tipo relato de caso de uma mulher com 51 anos de idade, a partir de dados coletados no prontuário médico e de exames complementares. **Relato de Caso:** paciente, sexo feminino, iniciou quadro de sintomas sugestivos de apendicite aguda confirmada por meio de exame físico e tomografia computadorizada de abdome, que evidenciou abdome agudo inflamatório com coleção entre as alças e íleo funcional. A cirurgia envolveu apendicectomia e enterectomia de tecido em necrose com anastomose primária, além de drenagem de abscesso. O anatomopatológico do apêndice resultou em adenocarcinoma mucinoso invasivo e a paciente obteve conhecimento do diagnóstico após cerca de um ano. Para o tratamento do adenocarcinoma, foi realizada ileocelectomia direita, com achado adicional de cisto ovariano. A cirurgia não apresentou intercorrências e a paciente evoluiu bem, realizando acompanhamento ambulatorial. **Conclusão:** o adenocarcinoma mucinoso de apêndice é uma neoplasia rara, cujo diagnóstico ocorre, na maioria dos casos, após análise histopatológica da peça cirúrgica. No caso apresentado, procurou-se enfatizar a necessidade da avaliação anatomopatológica minuciosa dos espécimes resultantes de apendicectomia.

**Palavras-chave:** Adenocarcinoma Mucinoso. Apendicectomia. Neoplasias do Apêndice.

## AGENESIA DE VESÍCULA BILIAR: RELATO DE CASO

Ana Eliza Fernandes Guimarães  
Tawany Nascimento Silva  
Jamile Pereira Dias dos Anjos

**Objetivo:** relatar o caso de uma paciente do sexo feminino, 15 anos de idade, com quadro de agenesia de vesícula biliar com ênfase no diagnóstico. **Materiais e métodos:** trata-se de estudo do tipo relato de caso de uma adolescente de 15 anos, com suspeita de agenesia de vesícula biliar. Foram analisadas as informações fornecidas pela mãe da paciente, associadas aos exames laboratoriais e de imagem solicitados para a investigação. O relato foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o parecer 6.024.493. **Relato de caso:** paciente, 15 anos, sexo feminino, com cardiopatia congênita corrigida cirurgicamente, apresentou, aos 3 anos de idade, dor abdominal difusa, sintomas dispépticos e náuseas associados à piora após alimentação. A investigação do quadro supracitado foi iniciada com exames laboratoriais, endoscopia digestiva alta e ultrassonografia. Esses últimos apresentaram como resultado de maior destaque a não visualização da vesícula biliar. A paciente evoluiu com melhora clínica espontânea e não deu prosseguimento à investigação do caso, devido à recusa de sua responsável legal. **Conclusão:** essa patologia congênita é rara e de difícil diagnóstico clínico, pois não há exames laboratoriais e não invasivos específicos para estudo do quadro. Apesar dos avanços apresentados pelos métodos de imagem para o diagnóstico dessa anomalia, a laparotomia continua sendo o mais fidedigno. Isso evidencia a necessidade de métodos diagnósticos pré-operatórios de maior sensibilidade, além de dados e diretrizes que possam nortear a prática clínica.

**Palavras-chave:** Agenesia. Vesícula Biliar. Diagnóstico.

## CISTO DO COLÉDOCO: RELATO DE CASO

Maria Luiza Gonçalves Salomão  
Milena Tofani Braga  
Vinícius Sampaio Campos  
Pedro Eleutério dos Santos Neto

**Objetivo:** descrever um caso clínico, abrangendo a sintomatologia, a propedêutica diagnóstica e o tratamento prescrito para um paciente com cisto do colédoco. **Materiais e Métodos:** trata-se de estudo caracterizado como relato de caso de cisto do colédoco. Desenvolvido a partir da coleta de dados obtidos em prontuário médico e dos resultados de exames do paciente, o estudo referido foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Funorte, sob o Parecer nº 5.917.970. **Relato de Caso:** paciente do sexo masculino, previamente hígido, procurou o pronto atendimento, aos 16 anos de idade, com dor abdominal inespecífica, apresentando melhora após analgesia simples. Seu quadro clínico persistiu por 4 anos sem alterações. Aos 20 anos, associados à dor, manifestaram-se sinais de alarme, como náuseas e vômitos. Após realização de ultrassonografia “*point of care*”, tomografia computadorizada e colangiorressonância magnética, diagnosticou-se cisto do colédoco tipo IA da classificação de Todani. Sua ressecção foi feita junto com o ducto cístico e a vesícula biliar. Além disso, foi realizada a hepatojejunostomia em Y de Roux, sem intercorrências. A peça cirúrgica enviada à biópsia revelou presença de colelitíase à macroscopia e ausência de atipias celulares à microscopia. O paciente está em acompanhamento devido ao risco de sofrer malignização do trato biliar. **Conclusão:** ressalta-se a importância do diagnóstico precoce para a prevenção da carcinogênese, bem como melhor exploração de cirurgias minimamente invasivas em adultos no Brasil. São necessárias, ainda, mudanças classificatórias para o cisto do colédoco e realização de protocolos específicos de acompanhamento pós-operatório.

**Palavras-chave:** Ductos biliares. Cisto do colédoco congênito. Dor abdominal. Icterícia. Anastomose em Y de Roux.

## CONHECIMENTO EM CUIDADOS PALIATIVOS ENTRE ESTUDANTES DE MEDICINA

Maria Luisa Ribeiro Brant Nobre  
Luiza Augusta Rosa Rossi-Barbosa  
Claudiojanes dos Reis

**Objetivo:** verificar o conhecimento sobre cuidados paliativos de estudantes de Medicina de Montes Claros - Minas Gerais. **Materiais e Métodos:** estudo transversal, descritivo com estudantes do 1º, 6º e 11º períodos. Utilizou-se o instrumento “*Palliative Care Knowledge Test*” - PCKT sobre filosofia, dor, dispneia, problemas psiquiátricos, gástricos e comunicação. Os resultados foram avaliados pela média das porcentagens de acertos, sendo insatisfatório até 50%, aceitável entre 51 e 70%, desejável entre 71 e 80% e excelente acima de 80%. Participaram 450 estudantes. **Resultados:** observou-se um aumento de acertos conforme a progressão dos períodos, mas com médias insatisfatórias ou aceitáveis. Entre os estudantes do 11º período, por exemplo, a pontuação ficou abaixo de 60% em cinco dos sete domínios testados. **Conclusão:** embora tenha havido um aumento das porcentagens de acertos nos períodos finais em relação aos iniciais, o 11º período apresentou médias de acertos inadequadas, apesar de já terem concluído mais de 90% do curso.

**Palavras-chave:** Cuidados paliativos. Conhecimento. Estudantes de Medicina.

## **DESAFIOS NO DIAGNÓSTICO E MANEJO CLÍNICO DA FEBRE DE ORIGEM INDETERMINADA: RELATO DE CASO**

Débora Ribeiro de Lira  
Karen Rafaella Aguiar  
Claudiojanes dos Reis

**Objetivo:** relatar e discutir o diagnóstico diferencial e o manejo clínico de um caso de Febre de Origem Indeterminada (FOI). **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo do tipo relato de caso, desenvolvido a partir de dados clínicos obtidos de registros do prontuário e exames ambulatoriais da paciente e da discussão multidisciplinar com profissionais da saúde de diferentes especialidades. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Funorte, sob o parecer nº 74724023.5.0000.5141. **Relato de Caso:** paciente do sexo feminino, 73 anos, com diabetes mellitus tipo 2 em tratamento. Apresentou febre recorrente, sudorese, perda de peso e anemia crônica. Exames laboratoriais revelaram persistentes pancitopenia, hiponatremia e provas inflamatórias elevadas, além de linfonodomegalia mediastinal. Exames de imagem evidenciaram alterações pulmonares e cerebrais e a endoscopia digestiva alta diagnosticou pangastrite por *H. pylori*. Apesar de extensa investigação e tentativas de suporte clínico, a paciente evoluiu com dispneia, convulsões, declínio cognitivo e pneumonia nosocomial, além de complicações como choque séptico, injúria renal aguda e parada cardiorrespiratória fatal. Obstáculos na realização de exames adicionais devido à falta de recursos. **Conclusão:** a FOI é um desafio diagnóstico complexo e esse caso ilustra a dificuldade em estabelecer uma etiologia definitiva para os sintomas da paciente. A abordagem multidisciplinar e colaborativa, com o envolvimento de diferentes especialidades médicas e recursos diagnósticos avançados, é crucial para lidar com casos clínicos complexos como o apresentado.

**Palavras-chave:** Febre de causa desconhecida; Diagnóstico clínico; Diagnóstico Diferencial; Gerenciamento Clínico; Recursos Financeiros em Saúde.

## DIAGNÓSTICO DA SÍNDROME DE MAY THURNER: RELATO DE CASO

Karla Geovana Oliveira Cardoso  
Lara Cotrim Virgens  
Carla Patrícia Perpétua Medeiros  
Pedro Eleutério dos Santos Neto

**Objetivo:** descrever um caso, destacando o diagnóstico de paciente apresentando síndrome de May Thurner, tendo trombose venosa profunda como primeira e única manifestação clínica. **Materiais e Métodos:** trata-se de estudo descritivo do tipo relato de caso de paciente, sexo feminino, 23 anos, atendida em 2020, com diagnóstico de síndrome de May Thurner. **Relato de Caso:** a paciente apresentou-se para atendimento em pronto socorro com sintomas inespecíficos, como dor súbita, edema e cianose em membro inferior esquerdo e claudicação associada à dor em cólica em fossa ilíaca esquerda, e foi diagnosticada com trombose venosa profunda. Somente após onze meses de investigação da causa base para esse evento, foi diagnosticada a síndrome de May Thurner, através da angiotomografia computadorizada com contraste e, a partir disso, optou-se pela terapia conservadora. **Conclusão:** ressalta-se a importância do reconhecimento dessa síndrome para a realização do diagnóstico rápido, a fim de estabelecer medidas terapêuticas precocemente, principalmente nos candidatos a realizarem uma terapia intervencionista, favorecendo, assim, o seu prognóstico final.

**Palavras-chave:** Síndrome de compressão da veia ilíaca. Trombose venosa profunda. Angiografia.



## DIAGNÓSTICO E MANEJO CLÍNICO DA SARCOPENIA EM PACIENTES CIRRÓTICOS: REVISÃO SISTEMÁTICA INTEGRATIVA DA LITERATURA

Felipe Barros Meireles  
Naysson Thierry Fernandes dos Reis  
Claudiojanes dos Reis

**Objetivos:** identificar, analisar e compreender a sarcopenia em pacientes cirróticos, bem como investigar métodos de diagnósticos e protocolos de tratamentos para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. **Materiais e Métodos:** o levantamento bibliográfico baseou-se na Metodologia PRISMA, por meio da busca em acervos virtuais como PubMed. O *corpus* analítico contou com 31 produções bibliográficas divididas em: revisões sistemáticas, análises clínicas, estudos randomizados e documentos de orientação. A análise foi sistemática integrativa com o intuito de oferecer uma visão ampla sobre o tema. **Resultados:** diante da complexidade da síndrome de sarcopenia, não há padronização de um método de diagnóstico e nem um tratamento único para atenuar as complicações advindas da síndrome. Ainda assim, essa foi a maior preocupação presente nas pesquisas analisadas. Recomendações, como o Questionário SARC-F e medidas da massa muscular, como bioimpedância elétrica ou densitometria óssea por DXA, para a avaliação clínica e protocolos de tratamento, como prática de atividade física, recomendações nutricionais, suplementação de proteínas e hormônios e farmacoterapia, foram as medidas de intervenção apontadas pela maioria dos estudos. **Conclusão:** os estudos sobre sarcopenia em pacientes cirróticos são relevantes para a prática médica, pois exige do profissional o conhecimento necessário sobre a complexidade da doença e suas possibilidades de tratamento, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

**Palavras-chave:** Sarcopenia. Pacientes Cirróticos. Clínica Médica. Diagnóstico de Sarcopenia. Tratamento para Sarcopenia.

## DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE TERATOMA MEDIASTINAL: UM RELATO DE CASO

Hilana Danielle Honorato Veloso  
Fernanda Luisa Barbosa Quintino  
Claudiojanes dos Reis

**Objetivo:** relatar o caso de uma paciente com teratoma mediastinal benigno, descrever sua sintomatologia, o diagnóstico e a abordagem terapêutica. **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo do tipo relato de caso de uma mulher de 24 anos, diagnosticada com teratoma benigno mediastinal aos 12 anos de idade, que foi submetida à ressecção cirúrgica na ocasião do diagnóstico. **Relato de Caso:** paciente queixava-se, durante a infância, de tosse, dor torácica e dispneia. Foi diagnosticada ao acaso, após realização de radiografia de tórax, encaminhada ao cirurgião torácico e submetida à ressecção cirúrgica. Evoluiu com sangramento peroperatório importante e choque hipovolêmico, sendo necessária transfusão sanguínea. Dez anos após o procedimento, apresenta-se sem sequelas e sem recidivas. **Conclusão:** ressalta-se a importância do diagnóstico precoce e da abordagem cirúrgica adequada para reduzir sangramentos e complicação durante a ressecção cirúrgica.

**Palavras-chave:** Teratoma benigno de mediastino anterior. Ressecção de teratoma mediastinal. Tumor de mediastino anterior em criança.

## **EIXO ENCÉFALO-INTESTINO: RELAÇÃO ENTRE A MICROBIOTA INTESTINAL E SINTOMAS DEPRESSIVOS**

Lúcia Dannielly Antunes Faria  
Jamile Pereira Dias dos Anjos

**Objetivo:** analisar a relação entre a desregulação do eixo encéfalo-intestino e o desenvolvimento de sintomas depressivos, considerando o papel do microbioma gastrointestinal. **Materiais e Métodos:** revisão sistemática da literatura e foi guiado pela questão chave: "As desregulações do eixo cérebro-intestino se correlacionam com o desenvolvimento de sintomas depressivos?" Para a coleta de dados, fez-se necessário recorrer a artigos indexados nas bases de dados PubMed e BVS nos últimos dez anos. **Resultados:** a revisão da literatura incluiu a análise de 32 estudos que abordam a relação entre o eixo encéfalo-intestino e a depressão. Os resultados evidenciaram a importância da microbiota gastrointestinal para a regulação do humor e do comportamento emocional, haja vista que alterações em sua composição estão associadas a sintomas depressivos. Diante disso, entende-se que a modulação da microbiota, através da dieta e de intervenções específicas pode ter efeitos benéficos no tratamento da depressão. **Conclusão:** os achados dos estudos discutidos nesta revisão demonstram que há relação entre a microbiota intestinal e o sistema nervoso, pois foram observados comportamentos depressivos e ansiosos entre alguns pacientes com disbiose.

**Palavras-chave:** Depressão. Eixo Encéfalo-Intestino. Microbioma Gastrointestinal.

## GRAVIDEZ HETEROTÓPICA, UMA EMERGÊNCIA CIRÚRGICA: RELATO DE CASO

Carolina Pinheiro  
Luiza Alana Valeriano  
Jamile Pereira Dias dos Anjos

**Objetivo:** relatar um caso de quadro de gravidez heterotópica em uma paciente em acompanhamento de pré-natal. **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo do tipo relato de caso de uma mulher de 35 anos, primigesta. **Relato de caso:** paciente em acompanhamento de pré-natal de risco habitual para gravidez eutópica simples, confirmada por ultrassonografia, refere quadro de dor abdominal intensa em fossa ilíaca esquerda de 5 dias de duração, 8 semanas após realização do exame de imagem. Encaminhada ao hospital de referência após analgesia sem melhora do quadro, paciente foi admitida com manutenção da dor abdominal intensa, estado geral comprometido, febril e hipocorada. Após ser examinada por equipe e ser realizada nova ultrassonografia, encontrou-se achado sugestivo de gravidez ectópica em tuba uterina esquerda e gravidez tópica (uterina). Paciente é submetida a laparotomia e salpingectomia à esquerda, devido à presença de massa necrosada que, após análise anatomopatológica, confirmou gestação ectópica. Após procedimento, a paciente teve melhora clínica e manutenção da gravidez tópica com acompanhamento para pré-natal de alto risco. **Conclusão:** a gravidez heterotópica espontânea pode desenvolver-se com sinais de alarme característicos de um abdome agudo, e o diagnóstico precoce e a abordagem cirúrgica em tempo hábil são capazes de reduzir a morbimortalidade da gestante e manter a viabilidade da gestação tópica.

**Palavras-chave:** Gravidez Heterotópica. Gravidez Ectópica. Emergência. Abdome Agudo.

## **IMPLICAÇÕES DE UMA MATERNIDADE ATÍPICA: ESTADO PSICOSSOCIAL DAS MÃES DE CRIANÇAS AUTISTAS**

Carolina Reis Teixeira  
Evandro Barbosa Dos Anjos

**Objetivo:** avaliar o estado psicossocial das mães de crianças diagnosticadas com TEA. **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo quantitativo de amostra não probabilística com aplicação de questionários a mães de filhos com TEA, acompanhados pela Associação Norte-Mineira de Apoio ao Autista (ANDA) da cidade de Montes Claros (MG). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob Parecer de número 5.676.08. **Resultados:** foi possível identificar os fatores estressores e que diminuem a qualidade da saúde mental e qualidade de vida das mães de crianças diagnosticadas com TEA: baixa condição financeira, incapacidades adaptativas dos filhos, restrições de sociabilização e de trabalho dessas mães, cansaço físico, sobrecarga emocional, diminuição da autoestima e limitada rede de apoio. **Considerações finais:** a condição do TEA do filho não foi um fator estressor para as mães entrevistadas, mas, sim, as consequências dos encargos e preocupações de lidar com os estímulos, cuidados e gastos de que a criança necessita. Uma das responsabilidades dos profissionais de saúde é reconhecer e abordar as fragilidades emocionais dessas mães de modo a melhor auxiliá-las.

**Palavras-chave:** Transtorno do Espectro do Autismo. Mães. Saúde mental.

## **IMPORTÂNCIA DA DERMATOSCOPIA DIGITAL NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PORTADOR DA SÍNDROME DO NEVO DISPLÁSICO: RELATO DE CASO**

Daniela Rocha Fonseca  
Lara Silva Lopes  
Claudiojanes dos Reis

**Objetivo:** relatar um caso clínico de como deve ser feito o acompanhamento de um paciente portador da síndrome do nevo displásico e discutir a importância do mapeamento corporal e da dermatoscopia digital no diagnóstico precoce do melanoma nessa população. **Materiais e Métodos:** trata-se de estudo descritivo do tipo relato de caso. Os dados foram colhidos por meio do prontuário e arquivos do paciente. **Relato de Caso:** paciente do sexo masculino, 15 anos de idade, portador de albinismo oculocutâneo e síndrome do nevo displásico, com diagnóstico prévio de melanoma extensivo superficial em 2021 e sem histórico familiar de melanoma. Esse contexto destacou a necessidade de rigoroso acompanhamento dermatológico com dermatoscopia digital e mapeamento corporal, atentando-se ao elevado risco de recorrência neoplásica. Na dermatoscopia digital, foram identificadas 204 lesões melanocíticas, com lesões de alto risco, sendo necessária a realização de biópsia de uma das lesões. Em um exame subsequente, três lesões suspeitas foram excisadas e analisadas. Duas eram nevos melanocíticos compostos e a terceira, embora inicialmente diagnosticada como nevo composto de Spitz, gerou dúvidas à especialista. No entanto, dois patologistas confirmaram a ausência de anormalidades na amostra, descartando uma nova neoplasia maligna. Devido ao alto risco e à atividade melanocítica intensa, o paciente segue em acompanhamento com intervalos menores. **Conclusão:** a dermatoscopia é essencial no acompanhamento de pacientes com síndrome do nevo displásico, pois permite a detecção precoce de alterações sutis nos nevos com risco de malignidade, resultando em um tratamento mais eficaz e oportuno e em uma diminuição de complicações.

**Palavras-chave:** Nevo Displásico. Dermatoscopia. Melanoma Maligno.

## LEISHMANIOSE MUCOCUTÂNEA FACIAL: RELATO DE CASO

Adilca Maria Colares  
Claudiojanes Reis

**Objetivo:** relatar um caso, destacando apresentação clínica e conduta terapêutica, de paciente com leishmaniose mucocutânea facial em palato, úvula e mucosa nasal, após relato pessoal prévio de leishmaniose cutânea, tratada há 25 anos. **Materiais e Métodos:** trata-se de estudo descritivo do tipo relato de caso. Os dados foram colhidos de arquivos do paciente. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o Parecer de número 6.568.086. **Relato de Caso:** paciente de oitenta anos, do sexo masculino, atendido em 2023 com diagnóstico de leishmaniose mucocutânea facial, apresentou-se para atendimento com propedêutica diagnóstica iniciada e direcionada por queixa de lesões eritematosas, pouco dolorosas, localizadas em mucosa de palato, úvula e narina esquerda. Mediante relato de tratamento prévio para quadro de leishmaniose cutânea com uso do antimoniato de meglumina e contraindicação para o uso dessa medicação, optou-se pelo tratamento hospitalar com uso da anfotericina B lipossomal, com boa resposta clínica final. **Conclusão:** ressalta-se a particularidade da apresentação clínica da leishmaniose mucocutânea facial, sua relação com quadros prévios de leishmaniose cutânea e as contraindicações do tratamento medicamentoso de primeira linha, uma vez que o diagnóstico precoce e o tratamento imediato favorecem o prognóstico desses pacientes.

**Palavras-chave:** Leishmaniose Mucocutânea. Leishmania braziliensis. Tratamento Farmacológico.

## MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL NA DOENÇA DE KIKUCHI-FUJIMOTO: RELATO DE CASO

Bárbara Ribeiro  
Larah Fabiana Maurício Ribeiro  
Pedro Eleutério dos Santos Neto

**Objetivo:** relatar caso de paciente com doença de Kikuchi-Fujimoto enfatizando as manifestações clínicas e a importância do diagnóstico diferencial no período da doença. **Método:** estudo de caso de uma mulher de 30 anos, diagnosticada com a doença de Kikuchi-Fujimoto aos 27 anos de idade, cujos dados foram coletados no prontuário da paciente. **Relato de caso:** paciente compareceu ao PSF de uma cidade de pequeno porte no norte de Minas Gerais, apresentando sintomas inespecíficos, como linfadenomegalia em região cervical, axilar e inguinal, sudorese, febre e perda ponderal. No atendimento, foram-lhe solicitados exames laboratoriais, que demonstraram alterações de caráter inflamatório, corroborando para que se levantassem como hipóteses diagnósticas: linfoma, leucemia e tuberculose ganglionar. Após um ano de investigação, através de biópsia de linfonodo e análise imuno-histoquímica, foi diagnosticada Doença de Kikuchi-Fujimoto. Devido ao curso benigno e autolimitado da doença e à persistência do quadro clínico, optou-se por tratamento sintomático com uso de dipirona 1 g, 6/6 horas, associado ao imunomodulador, metotrexato 7,5 mg, semanalmente. **Conclusão:** ressalta-se a importância de colocar a doença de Kikuchi-Fujimoto como diagnóstico diferencial nos casos de acometimento linfonodal sem outras causas típicas, pois, o diagnóstico precoce diminui o receio dos pacientes de que essa seja outras doenças mais graves, como o linfoma e a leucemia.

**Palavras-chave:** Doença de Kikuchi. Linfadenite necrotizante histiocística. Lúpus eritematoso sistêmico. Doença hiperimune.



## OLIGOIDRÂMNIIO SEVERO: RELATO DE CASO

Raul Soares Araújo  
Thiago Batista Arruda  
Jamile Pereira Dias dos Anjos

**Objetivo:** relatar o caso de uma paciente gestante com oligoidrâmnio severo, após ruptura prematura de membranas fetais. Para tanto, destacados seus achados clínicos, abordagem diagnóstica, terapêutica, propedêutica e complicações ocorridas. **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de caso, cujas informações foram obtidas por meio de entrevista realizada com a paciente, revisão de seu prontuário, registro fotográfico de documentos apresentados por ela, como exames complementares, cartão da gestante e sumário de alta. Além disso, realizou-se revisão da literatura. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Sob o parecer de número 5.963.174. **Relato de Caso:** paciente, 34 anos, apresentou ruptura da bolsa com 14 semanas de gestação, evoluindo com amniorrexe prematura e oligoidrâmnio acentuado. Por decisão conjunta da gestante e da equipe médica, foi indicada conduta expectante. Com 30 semanas e 3 dias, a gestação evoluiu com corioamnionite, levando à indicação do parto cesáreo, que se deu sem intercorrências maternas. Todavia, o recém-nascido necessitou de suporte prolongado em terapia intensiva. **Conclusão:** Ressalta-se que o oligoidrâmnio severo é de alta gravidade, portanto o diagnóstico precoce, o acompanhamento na gestação de alto risco e a avaliação clínica individualizada são essenciais para minimizar abordagens desfavoráveis e morbimortalidade materno-fetal.

**Palavras-chave:** Oligo-Hidrâmnio. Ruptura Prematura de Membranas Fetais. Diagnóstico. Tratamento.

## **PNEUMOTÓRAX ESPONTÂNEO PRIMÁRIO: RELATO DE CASO**

Gabriella Almeida Carvalho  
Igor Matheus Da Silva Pessoa  
Claudiojanes Reis

**Objetivo:** relatar um caso, destacando achados clínicos e propedêutica, de paciente com casos recorrentes de pneumotórax espontâneo primário. **Materiais e Métodos:** trata-se de estudo descritivo do tipo relato de caso de paciente, sexo masculino, 17 anos, com atendimentos de 2018 a 2022 com diagnóstico de pneumotórax espontâneo primário. **Relato de Caso:** paciente manifestou quadros repetidos de pneumotórax espontâneo primário, em hemitórax esquerdo, em um período de cinco anos. Não apresentava comorbidades ou fatores de risco significativos. No decorrer dos episódios, houve sintomatologia variada, com alguns sintomas recorrentes, como a dor pleurítica, dispneia e parestesia em região torácica. Foi submetido a diversas drenagens torácicas em selo d'água e a duas bulectomias, assim como a uma pleurectomia total. **Conclusão:** notou-se a necessidade de considerar a avaliação e possível intervenção pela cirurgia torácica precocemente, para evitar quadros recidivantes, como o exposto, e promover melhora da qualidade de vida dos pacientes pediátricos.

**Palavras-chave:** Pneumotórax Espontâneo Primário. Pneumotórax Hipertensivo. Toracostomia.

## SÍNDROME DE QUEBRA NOZES: UM RELATO DE CASO

Giovanna Cândida Rodrigues de Almeida Porcino

Jéssica De Oliveira Rodrigues

Jamile Pereira Dias Dos Anjos

Pedro Henrique Moreira César Lopes

**Objetivo:** relatar o caso de uma paciente que após ser submetida a uma extensa investigação, apresentou o diagnóstico de Síndrome de Quebra Nozes. **Materiais e Métodos:** Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de caso de uma mulher de 28 anos diagnosticada com a Síndrome de Quebra Nozes. **Relato de caso:** Paciente apresentou hematúria súbita e sintomas inespecíficos, como dor em flanco esquerdo, não explicada com exames laboratoriais. Dessa forma, iniciou investigação com vários especialistas, realizou exame de imagem, como a Urotomografia computadorizada com contraste que, associada à clínica, chegou ao diagnóstico. **Conclusão:** Ressalta-se a importância de continuar a investigação propedêutica após exclusão de causas comuns de hematúria, adicionando exames de imagem à investigação, sendo necessário considerar a Síndrome de Quebra Nozes como diagnóstico diferencial.

**Palavras-chave:** Artéria Mesentérica Superior. Hematúria. Diagnóstico.

## SÍNDROME DE SENIOR-LOKEN: RELATO DE CASO

Rayssa de Almeida Menezes  
Rauana Vitória Bezerra Vieira de Araújo  
Claudiojanes dos Reis

**Objetivo:** relatar um caso, destacando os achados clínicos e evolução, acerca de uma nova variante gênica ainda não relatada na literatura. **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo do tipo relato de caso de paciente, sexo feminino, 35 anos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética sob o Parecer de número 5.925.398. **Relato de Caso:** paciente apresentou-se para atendimento ambulatorial aos 12 anos, sendo diagnosticada inicialmente com Hipertensão Arterial Essencial. Ao decorrer dos anos, foram identificadas novas comorbidades, como insuficiência renal crônica, retinite pigmentar (RP) e fibrose hepática. Aos 32 anos, realizou um sequenciamento de exoma que evidenciou a presença da mutação (p. Leu964Pro ENST00000399820) no gene WDR19, o que permitiu o levantamento hipotético de uma nova variante para a Síndrome de Senior-Loken 8. A paciente se encontra em tratamento expectante quanto à RP, em uso de anti-hipertensivos nefroprotetores e dos antidiabéticos empaglifozina e metformina (off label), mesmo sem distúrbios glicêmicos, mantendo boa evolução clínica. **Conclusão:** em vista dos achados clínicos e moleculares, é possível correlacionar a nova variação gênica encontrada à Síndrome de Senior-Loken 8. A evolução lenta e atípica das patologias de base, somada à raridade e ao pouco conhecimento da síndrome, dificultou o diagnóstico precoce. Ressalta-se, portanto, a importância do diagnóstico genético, para que suas variações gênicas sejam conhecidas e acrescentadas à literatura.

**Palavras-chave:** Retinite Pigmentosa. Doença renal terminal. Variação genética. Diagnóstico.

## TÉCNICA DE FIGUEIREDO EM MORDEDURA DE ANIMAL: RELATO DE CASO

Amanda Lima Mota  
Thalita Victoria de Angelis Vieira Lopes  
Pedro Eleutério dos Santos Neto

**Objetivo:** analisar o uso de uma prótese de polipropileno para cobrimento de ferida, conhecida como técnica de Figueiredo, em paciente vítima de mordedura canina com perda tecidual. **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo descritivo caracterizado como relato de caso. Os dados foram colhidos de prontuários e arquivos da paciente. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o Parecer de número 6.102.745. **Relato de Caso:** paciente de sessenta e sete anos, do sexo feminino, apresentou-se para atendimento no ano de 2022 após ser vítima do ataque de cachorro de origem desconhecida, que lhe causou perda cutânea significativa e exposição de partes nobres e essenciais para a funcionalidade da mão esquerda. Após ser realizada a técnica de Figueiredo em bloco cirúrgico, permaneceu em enfermaria cirúrgica por três dias para uso de antibiótico: cefalexina 500mg, de 12 em 12 horas. Paciente teve cicatrização completa em três meses. **Conclusão:** ressalta-se a importância de inserir o conhecimento entre o meio acadêmico e médico sobre a proteção de determinadas feridas abertas usando uma prótese de polipropileno devido à sua alta disponibilidade em todos os serviços de saúde, baixo custo, efetividade na finalidade de manter a ferida protegida de infecções e diminuir o desconforto durante a troca de curativos enquanto a pele realiza sua cicatrização por segunda intenção.

**Palavras-chave:** Prótese. Mordedura Canina. Procedimentos ortopédicos. Cicatrização

## TRANSPLANTE DE ALOENXERTO EM RE-RUPTURA DE TENDÃO QUADRICIPITAL: UM RELATO DE CASO

Esther Malheiros Gomes  
Thainá Rocha de Carvalho  
Claudiojanes Reis

**Objetivo:** relatar caso de três episódios de ruptura de tendão quadricipital (TQ) em um mesmo paciente. **Materiais e Métodos:** trata-se de estudo descritivo do tipo relato de caso, com amostra de um paciente do sexo masculino, 46 anos de idade, abordado em 2021 devido à segunda re-ruptura do TQ. A coleta de dados foi realizada a partir de prontuários, fotos e vídeos com autorização do paciente. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o Parecer de número 6.175.307. **Relato de Caso:** paciente deu entrada no serviço de saúde após dezoito dias de início de dor aguda em região anterior de joelho esquerdo concomitante à percepção de estalido no local, ocorridos durante exercício de agachamento. Possui história pregressa de dois episódios prévios de ruptura do TQ. Atribuiu-se diagnóstico de re-ruptura do TQ secundariamente à fratura por estresse patelar devido às fitas de sutura tipo FiberTape® utilizadas em cirurgia anterior para reconstrução do TQ. Optou-se, como tratamento, pelo transplante de aloenxertos de tendões grácil, flexor profundo dos dedos da mão e fáschia lata. A última avaliação do paciente ocorreu um ano e quatro meses após a cirurgia, apresentando como única sequela déficit final em movimento de extensão do joelho, com limitação para a realização de corridas. Apresenta-se ativo, com prática de natação, musculação e ciclismo. **Conclusão:** episódios de re-rupturas de TQ são incomuns e requerem tratamentos específicos, sendo o transplante de aloenxerto um método eficaz com bom prognóstico.

**Palavras-chave:** Tendão. Ruptura. Enxerto Homólogo. Terapêutica. Intervenção Cirúrgica.

## VÁLVULA DE URETRA POSTERIOR: UM RELATO DE CASO

Maria Izabel Silveira Gonçalves  
Maria Tereza Veloso Costa  
Claudiojanes dos Reis

**Objetivo:** relatar um caso de válvula de uretra posterior em um paciente do sexo masculino, 3 anos de idade, diagnosticado intraútero com desenvolvimento de complicação hidronefrose grau III. **Materiais e Métodos:** estudo descritivo caracterizado como relato de caso. Os dados foram colhidos de prontuários e arquivos do paciente. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o Parecer de número 6.170.404. **Relato de caso:** paciente intraútero, do sexo masculino, portador de válvula de uretra posterior diagnosticado por meio de ultrassonografia realizada em consulta pré-natal de rotina. Nascido de parto vaginal, submetido à cirurgia para suporte clínico, cistostomia, além de antibioticoterapia profilática com boa resposta ao tratamento. Além disso, após 2 anos do primeiro método de tratamento, foi realizada cirurgia, uretroplastia definitiva (ablação), considerando-se o paciente curado de sua patologia inicial e apto para seguir consultas de puericulturas preconizadas pelo Ministério da Saúde. A ampla apresentação clínica dessa patologia exige tratamento com equipe multidisciplinar e pode causar impacto na qualidade de vida dos pacientes. **Conclusão:** a válvula de uretra posterior é causa importante de doença renal crônica e mostra-se imprescindível o tratamento precoce e multidisciplinar para melhorar a qualidade de vida do paciente e de seus cuidadores.

**Palavras-chave:** Válvula de uretra. Hidronefrose. Anomalias congênicas. Doença renal crônica. Ablação.

## ANGIOEDEMA HEREDITÁRIO, UMA EMERGÊNCIA MÉDICA: RELATO DE CASO

Anderson Carvalho Levi Franco  
Paulo Fillipe Romero  
Magna Adaci de Quadros Coelho  
Wille Dingsor Souza Pereira

**Objetivo:** documentar e descrever detalhadamente a apresentação clínica, o manejo e o desfecho de um paciente diagnosticado com Angioedema Hereditário (AEH). **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de caso de um paciente de 34 anos diagnosticado com AEH. **Relato de Caso:** trata-se de um paciente, sexo masculino, 34 anos de idade, portador de Angioedema Hereditário (AEH) tipo I. Com oito anos de idade deu entrada no hospital com um quadro de intenso edema na face e dispneia e após o atendimento foi encaminhado ao especialista para investigar uma possível doença alérgica, quando foi feito o diagnóstico desta doença rara. Desde então ele apresenta episódios intermitentes de edema em membros superiores e inferiores, face, glote e abdome, levando-o a inúmeras visitas ao pronto socorro hospitalar. Este caso de Angioedema Hereditário apresenta desafios significativos no tratamento e na qualidade de vida do paciente. A doença, apesar de ser genética e incurável, exige intervenções terapêuticas complexas para controlar as crises e evitar complicações graves. **Conclusão:** a colaboração contínua entre a equipe médica e o paciente é essencial para adaptar o tratamento às necessidades constantes de mudanças, assim proporcionar o melhor atendimento possível.

**Palavras-chave:** Angioedema. Angioedema hereditário. Inibidor de C1 esterase. Vasodilatação. Bradicininina.



## ASSOCIAÇÃO ENTRE MAUS TRATOS NA INFÂNCIA E DESENVOLVIMENTO DE DOENÇAS PSIQUIÁTRICAS: REVISÃO SISTEMÁTICA

Emily mariana nunes Silveira

Liz aurita viana Freitas

Wille dingsor souza pereira

**Objetivo:** associar os maus-tratos vividos na infância com o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos graves. **Materiais e Métodos:** trata-se de uma revisão sistemática sobre a associação entre abusos sofridos na infância e o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos. Utilizou-se a base de dados BVS por meio da chave de busca “experiências adversas na infância e transtornos psiquiátricos”. Foram selecionados 11 artigos para a construção da revisão, dos anos de 2021, 2022 e 2023. O idioma escolhido foi inglês. **Resultados:** os estudos destacam que adversidades na infância, como abuso físico, violência familiar, abuso sexual e maus-tratos emocionais, podem ter impactos significativos na vida adulta, incluindo problemas de saúde mental, exclusão social e criminalidade. A exposição combinada a múltiplas adversidades pode aumentar esses efeitos e há implicações neurológicas que podem afetar o controle emocional desses indivíduos. **Conclusões:** a alta incidência global de negligência e traumas na infância mostra, por meio das evidências analisadas, como essas adversidades oriundas dos maus-tratos afetam o desenvolvimento do sistema neural e aumentam o risco de transtornos psiquiátricos. Acredita-se que intervenções precoces, baseadas na família, para mitigar os efeitos da negligência infantil e o uso de dados de pesquisa para influenciar políticas embasadas em evidências podem ser eficazes.

**Palavras-chaves:** Maus tratos. Infância. Transtornos mentais.

## **DISTROFIA MIOTÔNICA TIPO 1 DE STEINERT: RELATO DE CASO**

Guilherme Ferreira Santos Silva  
Lara Thaís Prates E Silva  
Wille Dingsor Souza Pereira

**Objetivo:** descrever o quadro de um paciente portador de Distrofia Miotônica de Tipo 1 com sintomas da doença presentes há 6 anos, tendo seu diagnóstico elucidado aos 37 anos de idade. **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo caracterizado como relato de caso, em que o diagnóstico de Distrofia Miotônica Tipo 1 foi confirmado com base na história clínica e nos exames complementares. **Relato de Caso:** paciente do sexo feminino, 37 anos, do lar, comparece ao ambulatório de neurologia do Centro de Especialidades Médicas do Centro Universitário do Norte de Minas com queixa de desequilíbrio de caráter flutuante, percebido há 6 anos, associado a astenia e comprometimento da memória. O paciente enfrenta dificuldades crescentes devido à progressão da doença (miotonias e fraqueza muscular). Após reavaliação e baseados nos achados do exame físico e exames complementares, o diagnóstico de Doença de Steinert foi confirmado e a paciente foi encaminhada para acompanhamento multiprofissional além de receber orientações quanto aos aspectos previdenciários de sua condição de saúde, haja vista seu interesse sobre potenciais benefícios previdenciários advindos de sua patologia. **Conclusões:** a condução do caso exemplifica a importância da integração multidisciplinar para uma abordagem abrangente, eficiente e eficaz, essencial para oferecer suporte integral à paciente, gerenciar os sintomas e promover uma melhor qualidade de vida diante do diagnóstico desafiador de uma doença rara e progressiva como a Distrofia Miotônica de Steinert.

**Palavras-chave:** Distrofia Miotônica. Neurologia. Genética.

## SÍNDROME DE LESCH NYHAN: RELATO DE CASO

Karen Gonçalves Santos Ribeiro  
Maria Fernanda Rodrigues Lopes  
Wille Dingsor Souza Pereira

**Objetivo:** relatar um caso de um paciente portador da síndrome de Lesch Nyhan. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética Médica sob o número do protocolo: 6.746.438. **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo do tipo relato de caso de de uma criança de 6 anos de idade, do sexo masculino com diagnóstico de síndrome de Lesch Nyhan. **Relato de Caso:** paciente do sexo masculino, 6 anos, procurou atendimento devido a atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e queixa de areia em fralda. Havia distúrbio de movimento e automutilação apresentada como mordidas em lábios, mucosa jugal e mãos. Criança não apresentava deambulação, emitia sons inteligíveis. Após 5 anos da primeira consulta, aos 11 anos, síndrome de lesh nyhan é confirmada com teste genético demonstrando mutação do gene HPRT1. Nesse período criança fazia uso de Clonazepam, Periciazina 1% e Alopurinol. Apresentou melhora da questão comportamental, sem agressividade e alimentação sem engasgos. **Conclusões:** o presente estudo reforça a necessidade de educação médica para diagnósticos mais precoce e instituição de terapia específica para melhor manejo do paciente.

**Palavras-chaves:** Deficiência de hipoxantina-Fosforribosiltransferase. Síndrome de hiperuricemia. Gene HPRT1. Manifestações neurológicas.

## **O IMPACTO DA SÍNDROME DE BURNOUT NA CLASSE MÉDICA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19**

Lorene Mendes de Oliveira Brito

Paula da Silva Borges

Wille Dingsor Souza Pereira

**Objetivo:** analisar, na literatura, as consequências da síndrome de Burnout em médicos atuantes durante a pandemia de COVID-19. **Materiais e Métodos:** foi realizada uma revisão integrativa da literatura, nas bases de dados Biblioteca Virtual de Saúde, MEDLINE, PubMed e LILACS, utilizando critérios de inclusão e de exclusão bem definidos. A pergunta norteadora foi: "Qual o impacto do Burnout na classe médica ocasionado pela pandemia?". Foram eleitos 10 artigos para compor a amostra. **Resultados:** os estudos revisados revelaram um aumento significativo na prevalência da síndrome de Burnout entre os médicos durante a pandemia. A disparidade de gênero na incidência de Burnout merece atenção, com médicas apresentando maior risco. Médicos que trabalharam na linha de frente, especialmente na UTI, enfrentaram uma carga emocional intensa, que contribuiu para a síndrome. O Burnout tem sido correlacionado ao aumento nos erros médicos, menor desempenho profissional e redução na qualidade do atendimento ao paciente. **Conclusão:** o estudo destaca a importância de reconhecer e abordar a Síndrome de Burnout entre os médicos, especialmente em situações de crise, como a pandemia de COVID-19. A identificação precoce e o apoio à saúde mental são cruciais para mitigar o impacto negativo dessa síndrome. É fundamental conduzir mais pesquisas para desenvolver estratégias eficazes de prevenção e de intervenção, visando melhorar tanto a saúde dos médicos quanto a qualidade dos cuidados prestados aos pacientes.

**Palavras-chave:** Covid-1. Classe médica. Pandemia. Saúde mental. Síndrome de Burnout.

## FATORES DE RISCO ASSOCIADOS AO DESENVOLVIMENTO DOS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Matheus Lazaro Rodrigues Mendes  
Wille Dingsor Souza Pereira

**Objetivo:** identificar os fatores de risco associados ao desenvolvimento de ansiedade e depressão na infância e adolescência. **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo caracterizado como revisão de literatura integrativa que busca, dentro da literatura disponível, os fatores de risco que estão associados ao desenvolvimento dos transtornos de ansiedade e depressão na infância e adolescência. A base de dados utilizada para realizar a busca foi PubMed, **Resultados:** a análise dos 10 estudos selecionados revelou que essas patologias são multifatoriais e não isoladas, independentemente da amostra e do local do estudo. Ressalta-se a necessidade de mais pesquisas para identificar esses fatores de risco e suas associações, visando propor estratégias de prevenção para o público-alvo. **Conclusão:** foram associados ao desenvolvimento de depressão e ansiedade em crianças e adolescentes o histórico de depressão e ansiedade maternas, menor escolaridade materna, maior IMC materno pré-gestacional, negatividade em relação a gravidez, maior idade materna, maiores níveis de estresse familiar, má qualidade do relacionamento familiar, vitimização pelos pares e, por fim, fatores individuais como obesidade, comportamento sedentário baseado em telas, ruminação e noites de sono curtas.

**Palavras-chaves:** Depressão. Ansiedade. Fatores de risco. Adolescente. Criança.

## **FATORES DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRANSTORNOS DE HUMOR EM PACIENTES PORTADORES DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA**

Rafael Felipe Santos Silva  
Wille Dingsor Souza Pereira

**Objetivo:** identificar os principais fatores de risco para o desenvolvimento de transtornos do humor em pacientes com LES. **Materiais e Métodos:** trata-se de um estudo de revisão sistemática integrativa de literatura por meio de busca nas plataformas Pubmed e BVS. **Resultados:** Os trabalhos incluídos na revisão devem abordar especificamente os fatores de risco associados ao desenvolvimento de doenças mentais em pacientes com LES. Foram avaliados os transtornos depressivos, de ansiedade e estado confusional agudo, que são mais comumente encontrados nessa população. **Conclusão:** compreender transtornos de humor em LES é essencial, já que eles afetam a qualidade de vida e o curso da doença. Fatores como má adesão ao tratamento, falta de apoio e estigma contribuem para o desenvolvimento desses transtornos e podem levar a uma assistência inadequada. Mais pesquisas, especialmente no Brasil, são necessárias para melhorar o tratamento e a prática clínica para pacientes com LES.

**Palavras-chave:** Lupus Erythematosus. Systemic. Mental disorders. Psychiatry. Depression.

## TRATAMENTO CLÍNICO E CIRÚRGICO DA RETOCOLITE ULCERATIVA: RELATO DE CASO

Samuel Carvalho Miranda  
Victor Muniz de Magalhães  
Wille Dingsor Souza Pereira

**Objetivo:** demonstrar a abordagem clínica e cirúrgica de paciente diagnosticada com RCU, incluindo sua evolução, suas complicações pós-operatórias e seu prognóstico. **Materiais e Métodos:** trata-se de um relato de caso de paciente diagnosticada com RCU, submetida a tratamento clínico e cirúrgico (proctocolectomia total). **Relato de Caso:** mulher, 59 anos de idade, leucoderma, técnica de enfermagem, divorciada, previamente hígida, com história obstétrica de duas gestações, sem antecedentes pessoais de doenças crônicas. Apresentou aos 33 anos de idade, em sua primeira gestação, primeiro episódio de hematoquezia e diarreia mucossanguinolenta. Realizou-se lavagem intestinal, que foi seguida de um longo período de remissão espontânea. Após cerca de 14 anos de estabilidade clínica, apresentou recidiva do quadro diarreico associada à dor abdominal, no entanto, em colonoscopia não foram visualizadas anormalidades e a paciente permaneceu durante um ano sem tratamento específico. Foi submetida à laparotomia exploradora, identificando-se múltiplas aderências e dilatação de alças intestinais, além de semiestenose a 3 cm da anastomose ileal da abordagem cirúrgica prévia, com subsequente realização de enterectomia e enteroanastomose. **Conclusões:** o caso desta paciente destaca a importância da abordagem multidisciplinar no tratamento da RCU, envolvendo gastroenterologistas, cirurgiões, nutricionistas e outros profissionais de saúde, bem como a necessidade de buscar terapêuticas alternativas às convencionais para melhorar a resposta clínica e qualidade de vida dos pacientes.

**Palavras-chave:** Doenças inflamatórias intestinais. Retocolite ulcerativa. Proctocolectomia total. Doença de Crohn.